

Z území Kraje Vysočina je znám výskyt 308 druhů volně žijících ptáků, přičemž zde bylo zaznamenáno hnízdění 173 druhů. Významným biotopem pro ptáky jsou lesy, na které je na Vysočině vázán výskyt 82 druhů.



11

Datlík tříprstý (*Picoides tridactylus*) je charakteristický pro horské smrčiny a na Vysočině patří k nejvzácnějším druhům, které zde v lesích hnízdí.



12

Se **sýcem rousným** (*Aegolius funereus*) se na Vysočině setkáme nejčastěji v bučinách, kde hnízdí v dutinách po datlu černém (*Dryocopus martius*) [1].



13

Lejsek malý (*Ficedula parva*) hnízdící v bučinách patří mezi nejvzácnější lesní pěvce na Vysočině.




14

S **lejskem bělokrkým** (*Ficedula albicollis*) se na Vysočině setkáme nejčastěji v doubravách.



15

V posledních letech na Vysočině přibývá hnízdících párů **orla mořského** (*Haliaeetus albicilla*).



16

Čáp černý (*Ciconia ciconia*) hnízdí na Vysočině v různých typech lesů, přičemž vyhledává místa, která nejsou rušena lidmi.



1

www.prirodavysoliny.cz



V roce 2017 vydala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině v rámci projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.



text: Vojtěch Kodet foto: 1, 13 – Martin Pelánek; 2, 4, 5, 7-11, 14 – Vojtěch Kodet; 3 – Dana Kodetová; 6 – Petr Mückstein; 12 – Petr Tichý; 15 – Michael Fiala; 16 – Vojtěch Mrlík grafická úprava: Terezie Kodetová

Ptáci Vysočiny

Z hlediska druhové rozmanitosti ptáků jsou nejvýznamnějším biotopem mokřady. Na rybníky a další mokřady je na Vysočině vázán výskyt 135 druhů, které zde byly dosud zaznamenány.



Potápka černokrká (*Podiceps nigricollis*) patří v ČR k nejohroženějším druhům a též na Vysočině jsou její hnízdění v posledních letech výjimečná.




Při vhodných podmínkách hnízdí **potápka roháč** (*Podiceps cristatus*) i v malých koloniích, což je známo na Vysočině v posledních letech jen z jediné lokality.



Většina hnízdních kolonií **racka chechtavého** (*Chroicocephalus ridibundus*) na Vysočině již zanikla, proto ty existující vyžadují přísnou ochranu.




Hnízdění **vodouše rudonohého** (*Tringa totanus*) bylo na Vysočině v posledních letech prokázáno pouze na jedné lokalitě.



Bekasina otavní (*Gallinago gallinago*), patří v posledních desetiletích mezi nejvíce ubývající druhy ptáků v ČR, dosahuje na Vysočině nejvyšších početností.



Na Vysočině postupně obsazuje vhodné mokřadní lokality **slavík modráček** (*Luscinia svecica*).



Ledňáček říční (*Alcedo atthis*) je pravidelně hnízdícím druhem v březích vodních toků na celé Vysočině.



Husa velká (*Anser anser*) na Vysočině pozvolna zvyšuje početnost hnízdících párů.



Vysočina je v rámci ČR významnou hnízdní oblastí **poláka chocholačky** (*Aythya fuligula*).